



جامعة الموصل
كلية الطب البيطري

استقراء للحالات المرضية في الطيور الواردة الى المستشفى التعليمي البيطري من الفترة (٢٠٠٨-٢٠١٢)

رفل موفق اسماعيل الجليبي

تقرير / دبلوم عالي

الطب البيطري / امراض الطيور الداجنة

بإشراف

الاستاذ الدكتور

صلاح مهدي حسن

الخلاصة

في هذه الدراسة تمت مراجعة السجلات الخاصة الموجودة في صيدلية المستشفى التعليمي البيطري التابع لكلية الطب البيطري في جامعة الموصل للفترة (٢٠٠٨-٢٠١٢) للاطلاع على الحالات المرضية التي تصيب الطيور فضلاً عن أنواع الطيور الواردة للمستشفى اعلاه. وكان عدد الطيور الواردة ١٥٦٤ ، وقد بينت نتائج المراجعة أن الاصابات الفايروسية كانت الأكثر تواجداً في الطيور الواردة وبلغت نسبتها ٤٢٪، تلتها الاصابات الجرثومية وبلغت نسبتها ٢٧,٨٪، وبعدها أمراض نقص الغذائي التي بلغت نسبتها ١٨,٢٪. وأخيراً الاصابات الطفيلية التي بلغت نسبتها ١٢٪. بينت النتائج أن مرض نيوكاسل احتل المرتبة الاولى في الحالات الواردة للمستشفى التعليمي البيطري حيث سجل النسب (٣١,٢٥٪ ، ٢٤٪ ، ٢٤,٢٦٪ ، ٣٢,٢٨٪ ، ٢٩,٢٩٪) احتلت امراض نقص التغذية المرتبة الثانية في الحالات الواردة للمستشفى التعليمي البيطري حيث سجلت النسب (١٠,٩٣٪ ، ٧,٧٥٪ ، ١٤,٠٩٪ ، ٢٤,٧٥٪ ، ٢٢,٩٤٪) في حين احتل مرض الاكياس الهوائية المرتبة الثالثة في الحالات الواردة للمستشفى التعليمي البيطري حيث سجل النسب (٧,٨١٪ ، ١٣,٤٦٪ ، ١٥,٠٥٪ ، ١١,٤٢٪ ، ١٣,٠٥٪) وعلى التوالي للسنوات المشمولة بالدراسة. احتل الدجاج المرتبة الاولى من الحالات الواردة للمستشفى التعليمي البيطري بنسبة ٥٣,١٩٪، تلتها طيور الزينة في المرتبة الثانية بنسبة ٢٧,٦٪ وتلاه الحمام والديك الرومي بنسبة ١٥,٦٦٪ ، ٣,٥١٪ .

University of Mosul

College of Veterinary Medicine



**Observing the Clinical Case of the Poultry
in Teaching Veterinary Hospital ; Collage of
Veterinary Medicine ; University of
Mosul(2008-2012)**

Rafal Moufaq Al-Chalabi

Diploma / Report

Veterinary Medicine

Domesticated Avian Diseases

Supervised by

Prof.

Dr.Salah Mahdi Hasan

2014 A.D.

1435 A.H.

University of Mosul

Summary

In this study, collected informations from reported cards of veterinary hospital (clinic) / University of Mosul , a period from Jan 01,2008 to Dec 31, 2012 , to determine the data of pathological cases in this period , that affect the bird and to determine the types of birds .

Total infected birds number was 1564 . Viral infections revealed higher percentage 42% , and the incidence of other cases as follow : Bacterial infections 27.8 % Nutritional diseases 18.2% and last parasitic infections 12% also in this research new castle disease revealed a higher percentage and in the first rank in five years 31.25% , 24% ,24.26% , 32.28% , 29.29% respectively , while the incidence of other cases in five years as follow :

Nutritional disease (second rank) with percentage of 10.93% , 7.75% , 14.9% , 24.75% , 22.94% respectively , and the third rank was Air sacculitis with percentage of 7.18% , 13.46% , 15.5% , 11.42% , 13.5% respectively . Also in this study chicken show a higher percentage from total sum of birds 53.19% , pscittacin 27.6% , pigeon 15.66% and turkey 3.51% .